УДК [561:551.763] (477.7)
DOI: <http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.03>

О. Шевчук, канд. геол. наук, пров. наук. співроб.,
E-mail: hshevchuk@ukr.net,
Інститут геологічних наук НАН України,
вул. О. Гончара, 55 б, м. Київ, 01601, Україна;
Д. Пустовойтова, студ.,
E-mail: jamm3782@gmail.com,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

СТРАТИФІКАЦІЯ КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ РОЗРІЗУ СВЕРДЛОВИНИ № 29 – ЗАХІДНО-ОКТАБРЬСЬКОЇ (КАРКІНІТСЬКО-ПІВНІЧНОКРИМСЬКИЙ ПРОГИН) ЗА ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ

(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.В. Огарем)

Каркінітсько-Північнокримський прогин є перспективним регіоном України щодо пошуків вуглеводнів, а одним із головних нафтогазоносних комплексів є крейдовий. Тому важливо і необхідно детальне біостратиграфічне розчленування крейдових відкладів, що є основою для подальших пошукових робіт і для кореляції досліджених крейдових відкладів Каркінітсько-Північнокримської прогину з одновіковим відкладами суміжних регіонів. Особливо проблемною для розчленування і кореляції є слабодосліджена неоконська товща. За результатами вивчення мікрофітофосилій проведено стратифікацію крейдових відкладів Каркінітсько-Північнокримського прогину на прикладі опорної свердловини № 29 – Західно-Октябрьської. Виділено чотири спорово-пилкові комплекси: баремський, аптський, альбський та сеноманський. На досліджуваній території вперше проведено розчленування крейдових порід за систематичним складом диноцист, а також доповнена палеонтологічна характеристика відкладів за іншими групами мікрофосилій – спори та пилок вищих рослин, рештки зелених водоростей, акритархи та мікрофорамініфери.

Ключові слова: біостратиграфія, диноцисти, спорово-пилкові комплекси, крейдові відклади, Каркінітсько-Північнокримський прогин.

Вступ та постановка проблеми. Крейдові відклади Каркінітсько-Північнокримського прогину належать до недостатньо вивчених як у плані геологічної будови, так і палеонтологічної характеристики та детальної стратифікації відкладів, особливо нижньокрейдових.

Перспективність нижньокрейдових відкладів підтверджена відкриттям Західнооктябрьського і Тетянівського газоконденсатних родовищ і численними нафтогазопоясами на Борисівській, Серебрянській, Задорненській та інших площах (Мельничук, 2003), а також відкриттям нафтових і газових родовищ на сусідніх територіях – Румунському шельфі та північному Кавказі. Нафтогазоносність крейдового комплексу пов'язана з пісковиками неокон-апту та вулканогенно-упамковими породами альбу, що залягають на технічно доступних глибинах. Основними субрегіональними покривками є глинисті утворення нижньої, середньої та верхньої частин верхньоальбських під'ярусів (Жабіна та ін., 2015; Колодій, 1971).

Історія вивчення крейдових відкладів Каркінітсько-Північнокримського прогину. У 2000-ні рр. широкий розмах отримують геологічні дослідження, пов'язані з глибоким бурінням і пошуком корисних копалин на території Криму. Значний внесок у з'ясування геологічної будови та стратиграфії цих утворень зробили О.Т. Богаєць, В.Г. Бондаренко, С.М. Захарчук, Л.Г. Плахотний, І.В. Карпенко, Л.Ф. Плотнікова, Р.І. Лещух, Г.М. Волошина, Г.А. Орлова-Турчина, Л.М. Голубнича, М.А. Воронова, О.Ю. Каменецький, Н.І. Черняк, В.Є. Железняк, М.Д. Менкес, Н.М. Жабіна, Я.М. Тузьяк, М.В. Козленко, Н.А. Савицька, Р.А. Коваленко, Л.Г. Мінтузова, Н.А. Трофимович та ін. (Стратиграфія, 2013; Іщенко та ін., 2016).

Поряд із традиційними геологічними методами почало широко застосовуватись математичне моделювання з використанням комп'ютерної 3D графіки для вивчення геологічних процесів, а також дослідження геодинамічних процесів цього регіону (Єсіпович, 2002).

Значний внесок у розвиток паліоестратиграфії нижньої крейди Криму зробили М.А. Воронова, С.Б. Куваєва, Г.А. Орлова-Турчина та ін. (Стратиграфія..., 2013; Орлова-Турчина, 1966; Воронова, 1994). Вивчені

палінокомплекси берріасу, валанжину, готеріву, барему, апту та альбу Криму супроводжувалися фауністичними знахідками, у тому числі зональних видів амонітів і форамініфер (Іщенко та ін., 2016).

До сьогодні крейдові відклади Каркінітсько-Північнокримського прогину не були охарактеризовані палеоальгологічним методом.

Геологічна будова району досліджень. Каркінітсько-Північнокримський прогин є субширотною і асиметричною западиною, що зливається на сході із Сиваською, з якою вони становлять єдину глибоку зону опускання в північній частині рівнинного Криму. Вони розташовані в зоні зчленування Східноєвропейської платформи і Скіфської плити. Мезозойські й кайнозойські осадові товщі, що заповнюють їх, лягають таким чином як на палеозойський, так (у північній частині) і на докембрійський фундаменти. Північний борт прогину є похилою моноклінальною південного падіння, яка ускладнена виступами, структурними носами, рідше локальними складками, проявленими здебільшого в нижніх горизонтах осадового чохла. Центральна частина прогину та його південний борт побудовані значно складніше. У відкладах апту-альбу це чітко виражений грабен, обмежений з півдня і з півночі системою розломів як поздовжнього, так і діагонального орієнтування з амплітудою зміщення по докрейдових відкладах близько 1,5–2 км (Сидоренко, 1969).

Каркінітсько-Північнокримський прогин охоплює північну частину Рівнинного Криму та прилеглу до нього із заходу акваторію північно-західного шельфу Чорного моря. Південним закінченням прогину є схил Каламітсько-Центральнокримського мегапідняття та його акваторіального продовження.

Початок формування Каркінітсько-Північнокримського прогину відносять до початку альбського часу. В його межах без перерви від нижньої крейди до міоцену відклалися 3500–3600 м осадових утворень. Докрейдвий фундамент Каркінітсько-Північнокримського прогину розбитий диз'юнктивними порушеннями і має блокову будову. Найбільш виражені підняття і порушення розташовані на південному крилі прогину, яке

ускладнено трьома рядами куполоподібних складок, що об'єднуються іноді під назвою Тарханкутського вала (Сидоренко, 1969).

Каркінітсько-Північнокримський грабеноподібний прогин виповнений потужною товщею (до 10–11 км) мезозойсько-кайнозойських відкладів. Теригенні утворення нижньої крейди в прогині розвинуті достатньо широко. Вони залягають на утвореннях кристалічного фундаменту, верхнього тріасу чи середньої юри і перекриваються відкладами верхньої крейди. Розкрита товщина відкладів нижньої крейди від 230 м на заході Тарханкутського півострова (Чорноморська площа) до 2350 м в осьовій частині прогину (Серебрянська площа). В їхньому складі зустрічаються аргіліти з підпорядкованим значенням вулканогеннолавакових порід, пісковиків та алевролітів (Геологія..., 1984; Гожик та ін., 2006; Іщенко та ін., 2016).

Матеріал, методи та методики досліджень мікрофосилій. Об'єктом дослідження були мікрофосилії з крейдових відкладів свердловини № 29, пробуреної на

території Західнооктябрської площі Каркінітсько-Північнокримського прогину (рис. 1). Особливу увагу зосереджено на ортостратиграфічній групі – динофлагелят з метою детальної стратифікації відкладів.

Аналітичні роботи виконувалися за допомогою мікроскопа "Ергавал" і МБІ-6, фотографування проводилося цифровим фотоапаратом для мікрозйомки Konica Minolta Dimage X50 в Інституті геологічних наук НАН України. Зразки мікрофосилій зберігаються у відділі палеонтології і стратиграфії мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України. Ілюстровані мікрофосилії ідентифікуються за NRM-чисел і позначені за допомогою шукача координат (England-finder). У визначенні систематичного складу паліноморф використовувалися валідні таксони, прийняті як в українській, так й іноземній літературі (Воронова, 1994; Williams et al., 2017). Для ідентифікації диноцист застосована класифікація Р.А. Фенсоне та ін. (Fensome et al., 1993).

Загалом палінологічно досліджено 15 зразків порід з розрізу, що розкритий глибокою св. № 29.

Рис. 1. Оглядова карта

У результаті дослідження застосовано комплексний підхід із застосуванням літо- і біостратиграфічних методів. Основним методом досліджень був палінологічний: спорово-пилковий, палеоальгологічний; кутикулярний аналізи та ін.

У розрізі, що вивчався, були подані різні за віком і літологічним складом породи. Тому насиченість відкладів мікрофітофосиліями була різною. З огляду на це, важливим елементом досліджень був підбір індивідуальних методик обробки порід. Виявлення диноцист, спор і пилку вищих рослин, мацерацію порід проводили сепараційним способом, розробленим В.П. Гричуком (Гричук та ін., 1948) з деякими уточненнями: порода розчиняється в 10 % розчині соляної кислоти, заливається гарячим розчином пірофосфату натрію і відмивається від колоїдних глинистих частин, промивається через кожні 2–3 години дистильованою водою сифонним пристроєм, вода зливається до відмітки 2 см над осадам, після чого проводиться сепарація у важкій кадмієвій рідині з питомою вагою 2,25 (для спорово-пилкового аналізу) та 2,0 (для виокремлення диноцист).

Загальна характеристика групи. Диноцисти відіграють важливу роль для стратиграфії і є ортостратиграфічною групою. Але, якщо для деяких територій в силу високого ступеня вивченості вже розроблено й успішно застосовуються зональні шкали за диноцистами, то в інших регіонах ці завдання ще тільки вирішуються.

Історія дослідження диноцист в Україні. Уперше відмічено поодинокі диноцисти в крейдових відкладах на території Волині М.А. Вороноюю і Л. Каревою (Воронова і Карева, 1989) та в юрських і крейдових відкладах інших територій України (Воронова і Яновская, 1981). М.Є. Огороднік проводила палінологічні (у тому числі й палеоальгологічні) дослідження юрських і крейдових відкладів Передкарпатського прогину та нижньокрейдових – Азовського моря (Огороднік, 2006, 2007). На території Закарпатського прогину і Карпат А.С. Андреевою-Григорівич проведено дослідження пограничних крейдових і палеогенових відкладів за допомогою методу палеоальгології, встановлено біозональні підрозділи за диноцистами (Григорівич, 1979; Вялов та ін., 1989 а, б). Група польських і словацьких дослідників (палінолог –

Д. Рехакова) проводили розчленування юрських відкладів Карпат, у тому числі й українських за диноцистами (Rehakova et al., 2011). Біостратиграфічні дослідження юрських і крейдових відкладів усієї території України за групою диноцисти були розпочаті О.А. Шевчук уперше в 2005 р. і продовжуються сьогодні (Шевчук, 2005, 2006, 2011, 2013, 2020; Shevchuk and Vajda, 2016).

Вивчення пізньоюрських-ранньокрейдових органіко-стінних диноцист Гірського Криму почалося більше десяти років тому в ході проведення комплексних палеонтологічних досліджень юрських і крейдових відкладів досліджуваного регіону (Доротяк та ін., 2009; Shevchuk and Vajda, 2014).

Незважаючи на багатопланову і багаторічну історію вивчення мезозойського осадового комплексу України, мікрофито-лінійні дослідження крейдових відкладів Каркінітсько-Північнокримського прогину до недавнього часу не проводилися.

О.А. Шевчук та Д. Пустовойтовою вперше проведено дослідження крейдових відкладів за ортостратиграфічною групою диноцисти на території Каркінітсько-Північнокримського прогину, результати викладено в цій статті.

Результати досліджень. Сукупність спектрів, в яких простежується подібність якісних і кількісних показників, а також особливі риси, що дозволяють відрізнити їх від спектрів нижче і вище залягаючих відкладів, об'єднуються в палеонотичні комплекси (або спорово-пилкові комплекси і комплекси мікрофітопланктону та ін.). Таким чином, комплекс характеризує певний інтервал розрізу, відображає відповідний етап розвитку флори в межах досліджуваного регіону і фаціальні особливості відкладів. Комплекси є основою для виділення біостратиграфічних підрозділів за палеонотичними даними (палеостратонів): верств зі спорами і пилком або з

диноцистами, а також палеонотичних зон. Границями палеостратонів служать рівні зміни якісного і кількісного складу комплексів, які встановлюються за сумою ознак: поява нових видів, зникнення і максимальна присутність окремих таксонів, збільшення видового різноманіття (Шевчук, 2018). Отже, палеостратони є біостратиграфічними підрозділами комплексного об'єднання. Трактуються верств з диноцистами, спорами і пилком, прийнятими в цій роботі, відповідають вимогам Стратиграфічного кодексу України (Стратиграфічний..., 2012).

Палеоморфи є складовими палеонотичного комплексу, який поширений в межах басейну осадконакопичення. До складу палеоморф включають не тільки пилкові зерна і спори, але й динофлагелати, мікрофориамініфери, сілікофлагелати. Сьогодні термін "палеоморфи" широко вживається в разі відтворення умов седиментації та кореляції відкладів за палеонотичними даними і використовується як синонім для визначення всього комплексу мікрофосилій рослинного, тваринного і проблематичного походження, який виділяють у результаті сепараційних методів обробки порід.

Вивчено органіко-стінний мікрофітопланктон – диноцист і супутні мікрофосилії з метою детального розчленування розрізів крейди Каркінітсько-Північнокримського прогину. На основі детальних досліджень виявлено видовий склад і розподіл диноцист за розрізом, а також складено геологічну послідовність комплексів динофлагелат з розрізу св. № 29 (рис. 2). У відкладах св. № 29, що представлені пісковиками, аргілітами, алевролітами та глинами Каркінітсько-Північнокримського прогину, встановлено баремський, аптський, альбський та сеноманський спорово-пилкові комплекси і вперше визначено комплекси диноцист барему, апту, альбу та сеноману.

Рис. 2. Розріз крейдових відкладів, розкритий св. № 29, і стратиграфічне поширення диноцист і супутніх мікрофосилій

У мацератах зр. 1 (гл. 3142 м) із відкладів св. № 29 мало диноцист: поодинокі *Spiniferites ramosus* (Ehrenberg) Mantell., *Hystriochosphaeridium* sp., *Gonyaulacysta* sp. та *Oligosphaeridium* sp. У складі спорово-пилкового комплексу присутні поодинокі *Lycopodiumsporites* sp. та *Pinuspollenites* sp. Вік у цьому стратиграфічному інтервалі не встановлено.

Баремський ярус. Відклади баремського ярусу Рівнинного Криму представлені різнофаціальними утвореннями – сіро- і строкатокорінними континентальними, прибережними і мілководними морськими (гравелітами, конгломератами, алевролітами, пісковиками, аргілітами з малопотужними прошарками органогенно-детритових вапняків). Товщина відкладів баремського ярусу в Північно-кримському прогині становить декілька метрів. Треба відмітити, що баремські відклади Рівнинного Криму є найменш дослідженими, а на території Північнокримського прогину взагалі палеоніологічно не охарактеризовані. Незначна кількість кернавого матеріалу та недостатня його палеонтологічна та літологічна вивченість, різнофаціальний склад утворень тривалий час ускладнювали кореляцію означених відкладів на території дослідження.

Диноцисти. У проміжку 3130–3100 м св. № 29 простежено комплекс диноцист зони *Odontochitina operculata* (Gradstein et al., 2012), що датується баремом. Установлено великий вміст *Cribroperidinium* sp., *Pervosphaeridium pseudohystriochodinium* (Deflandre) Yun Hyesu., *Batiacaspaea* sp., *Sentudinium* sp. У комплексі характерне домінування *Spiniferites ramosus* (Ehrenberg) Mantell, дещо менше *Systematophora* sp., *Achomosphaera* sp., *Areoligera* sp., *Tubotuborella* sp., *Avellodinium* sp., *Circulodinium* sp. та ін. Постійними компонентами є *Dingodinium* spp., *Sirmiodinium grossii* Alberti, *Cleistosphaeridium* spp. Відмічаються поодинокі *Oligosphaeridium complex* (White) Davey and Williams, *Trichodinium* sp., *Exochosphaeridium* sp., *Cometodinium* sp., *Hystriochosphaeridium solare* Pestchevitskaya та зональний вид *Odontochitina operculata* (O. Wetzel) Deflandre and Cookson. Відмічено проксиматні диноцисти поганої збереженості. Простежена і вперше

встановлена на території України зона *Odontochitina operculata* відповідає однойменній зоні (у цьому ж стратиграфічному діапазоні) Міжнародної стратиграфічної шкали (Gradstein et al., 2012; 2020).

Баремський спорово-пилковий комплекс характеризується незначним переважанням пилку голонасінних (до 55 %) над спорами папоротеподібних (45 %). Спорова частина відрізняється різноманіттям спор схизейних: *Cicatricosisporites* sp., *Cicatricosisporites perforatus* (Mark.) Dor., *Appendicisporites stricornitatus* (Mark.) M. Voronova, *Trilobosporites* sp., *Pilososporites trichopapillosus* (Thiergart) Delc. And Sprum., *Klukisporites variegates* Coup. та поодинокі *Pelletieria* sp., *Pelletieriatersa* (K.-M.) Bolch. Серед глейхенієвих відмічені мілкі форми з гладкою скульптурою екзини: *Plisiferadelicata* (Bolch.) Bolch, *Gleicheniidites senonicus* Ross., *G. laetus* (Bolch.) Bolch. У невеликій кількості присутні спори матонієвих (*Matoniasporites phlebopteroides* Coup.), диксонієвих (*Coniopteris* sp.), циатейних (*Cyathidites australis* Coup., *C. minor* Coup.), а також *Leiotriletes* sp., *Trachytriletes* sp., *Chomotriletes* sp. та *Staplinisporites caminus* (Balme) Pock. Постійно зустрічаються спори, зближені із селягінелевими (*Densoisporites velatus* Weyl. And Krieg.) і плауноподібними (*Lycopodiumsporites* spp.). Клас голонасінних представлений пилковими зернами переважно *Cheilelepidiaceae*, відмічений пилко родин *Pinaceae*, *Podocarpaceae*, *Cupressaceae*, *Caytoniaceae*, поодинокі пилкові зерна *Eucomiidites* sp. Оскільки у зразках з гл. 3100 м уперше зустрічаються декілька екземплярів пилкових зерен найдавніших покритонасінних рослин (*Angiospermae*) *Clavatipollenites* sp., що характерні для вікового діапазону пізнього барему, можна припустити, що вік вмісних відкладів можливо датувати як пізньобаремський (рис. 3). Установлено органічну складову мікрофорамініфер (устілка, що повторює форму мушлі).

Відклади датовані пізнім баремом за даними спорово-пилкового аналізу та за вперше проведеними палеоальгологічними дослідженнями на території Каркінітсько-Північнокримського прогину.

Рис. 3. Розріз крейдових відкладів, розкритий св. № 29 та стратиграфічне поширення спор і пилку

Аптський ярус. Відклади аптського ярусу розповсюджені на всій території Рівнинного Криму. Вони характеризуються фаціальною мінливістю, але представлені, головним чином, морськими утвореннями: аргілітами, алевролітами та пісковиками з підпорядкованим значенням органогенних вапняків, мергелів, конгломератів, гравелітів тощо. Товщина аптських відкладів доволі стала і становить у середньому 100–150 м. Характерна наявність вуглефікованих рослинних решток (*Стратиграфія...*, 2013). У середньоаптський час на території Півдня України фіксується регіональний перерив в осадконакопиченні (*Іщенко та ін.*, 2016).

Диноцисти. У проміжку 3080–2350 м св. № 29 встановлено незначний вміст диноцист, а в деяких зразках взагалі поодинокими екземплярами. Серед виявлених диноцист більше *Odontochitina operculata* (O. Wetzel) Deflandre та *Chlamydomphorella nyei* Cookson and Eisenack, постійними компонентами є *Spiniferites ramosus* (Ehrenberg) Mantell, *Sentusidinium* sp., *Batiacaspiera* sp., *Hystichosphaeridium* sp., *Heterosphaeridium* sp., *Cleistosphaeridium* sp., відмічаються поодинокі *Exochosphaeridium phragmites* Davey et al., *Prolixosphaeridium* sp., *Achomosphaera* sp., *Cribroperidinium* sp., *Spiniferites* spp. На цьому стратиграфічному рівні біостратиграфічні підрозділи за диноцистами в Міжнародній стратиграфічній шкалі не виділяються (*Gradstein et al.*, 2012; 2020).

Аптський спорово-пилковий комплекс відрізняється від баремського переважанням спор папоротеподібних (до 80 %) над пилом голонасінних, який становить до 20 %. Спорова частина комплексу багата і різноманітна. Основною її рисою є переважання спор глейхенієвих (до 55 %): *Plicifradelidites* (Bolch.) Bolch, *Gleichenioidites circinidites* (Cook.) Brenn., *G. senonicus* (Ross.) Grig., *Clavifera triplex* (Bolch.) Bolch, *C. tuberosa* (Bolch.) Bolch., *C. rudis* (Bolch.) Bolch. та ін. Постійно присутні спори *Concavisporites junctum* (K. – M.) E. Sem., *C. juriensis* Balm. Також різноманітно подано папоротеподібні родів *Cicatricosisporites*, *Pelleteria* родини Schizaeaceae. Найбільшим видовим різноманіттям представлено спори, що мають гладку, шагренієву, бугорчасту, шипувату екзину, які порівнюються з представниками сучасного роду *Lygodium*. Вони представлені багатьма видами, з яких головними є *Lygodiumsporites subsimplex* (Bolch.) Bolch., *L. multiberculatum* (Bolch.) Bolch., *Trilobosporites* sp., *Trilobosporites asper* (Bolch.) M. Voronova, *T. cavernosus* (E. Ivan.) M. Voronova, *T. bernissartensis* (Delc. and Sprum.) Pot. Часті у спектрах спори з вічкуватою і сітчасто-вічкуватою скульптурою, що віднесені до роду *Klukisporites* (*Klukisporites visibilis* (Bolch.) Bolch.). Характерними є спори плаунів *Retitriletes austroclavatidites* (Cookson) Doring et al. У споровій частині знайдено форми, віднесені до штучних таксонів – груп *Leiotriletes*, *Trachytriletes*, *Staplinisporites*. Клас голонасінних представлений невеликою кількістю пилкових зерен. Зустрічається пилко *Pseudo picea magnifica* Bolch., *Pseudopinus* sp., *Protopinus sutschanensis* Verb. Варто відмітити, що пилко хвойних давнього вигляду хоч і перерахований, але трапляється в дуже незначній кількості і дуже рідко. Нечисленний, але постійний в комплексі пилко подокарпових, соснових (*Pinuspollenites* sp., *Cedripites* sp., *Podocarpus major* (Naum.) Bolch.). Пилко бенетитових і гімнових зустрічається в більшості спектрів, також присутній пилко *Ephedripites* sp., *Welwitschiapites* sp., *Welwitschiapites Alekhinii* Bolch. У комплексі характерна присутність пилку *Classopollis* sp. (10 %). Зустрічаються декілька екземплярів пилкових зерен найдавніших покритонасінних рослин

(Angiospermae) типу *Clavatipollenites* sp. Також у цьому комплексі відмічено мікрорештки деревини (рис. 2). Цей проміжок розрізу вміщує величезну кількість мікрорешток вищих рослин – спор і пилку і є найбільш насичений на детрит. Порівняно з поодинокими знахідками диноцист це може вказувати на прибережно-морські або континентальні умови.

Відклади датовані аптом в основному за власними даними спорово-пилкового аналізу та даними інших дослідників (*Воронова*, 1994) і доповнені палеоальгологічними даними на території Каркінітсько-Північнокримського прогину.

Альбський ярус. Альбські відклади в Рівнинному Криму широко розповсюджені. Їхня товща змінюється від перших десятків метрів у передгір'ях до понад 2360 м у найбільш зануреній частині Північнокримського прогину (Серебрянська площа). Відклади представлені сірими, темно-сірими (до чорних) алевротитими аргілітами із шарками алевролітів (*Стратиграфія...*, 2013).

Диноцисти. У проміжку 2902–2682 м св. № 29 простежено комплекс диноцист зони *Pterodinium aliferum* (*Gradstein et al.*, 2012; 2020), що датується раннім альбом. Підосва зони добре простежується за появою та домінуванням представників роду *Pterodinium aliferum* Eisenack. Для цього комплексу характерне видове різноманіття родів *Spiniferites* spp., *Oligosphaeridium* spp. та ін. Постійними в комплексі є *Coronifera oceanica* Cookson and Eisenack, *Achomosphaera* sp., *Callaiosphaeridium* sp., *Circulodinium distinctum* (Deflandre and Cookson) Jansonius та *Cribroperidinium* sp., *Apteodinium* sp., *Apteodinium maculatum* subsp. *grande* (Cookson and Hughes) Below, *Trichodinium* sp., *Odontochitina* sp. Встановлений комплекс зони *Pterodinium aliferum* відповідає однойменній зоні (у цьому ж стратиграфічному діапазоні) Міжнародної стратиграфічної шкали (*Gradstein et al.*, 2012). У комплексі присутні рештки зелених водоростей *Tasmanites* sp. та акритархи *Fromea* sp.

Альбський спорово-пилковий комплекс відрізняється від аптського різким зменшенням відсоткового вмісту спор глейхенієвих (*Gleichenioidites senonicus* Ross., *G. Angulatus* (Bolch.) Bolch., *Ornamentifera* sp. Характерні мілкі форми спор роду *Concavisporites* (*Concavisporites juriensis* Balme, *C. kainophyticus* (Krut.) M. Voronova) та спори, що віднесені до формального роду *Murosporoides* і поодинокі *Matonisporites* sp. Відмічені спори *Corniculatisporites* sp., характерні для альбських спорово-пилкових комплексів. Присутні плаунові та селягінелієві. Спостерігаються спори родин *Osmundaceae*, *Ophioglossaceae* (*Foveosporites* sp., *Ophioglossum* sp.) і мохоподібні. Голонасінні представлені пилом родини *Pinaceae* (*Pinuspollenites* та *Cedripites*), *Cupressaceae* та ін. Участь пилку *Classopollis* sp. – до 3 %. Пилко покритонасінних до – 8 %, він відмічається в основному у вигляді поодиноких зерен і представлений *Clavatipollenites* sp., *Clavatipollenites hughessi* Coup., *Tricolpopollenites* sp., *Tricolpites* sp., *Tricolporopollenites* sp., *Retitricolpites* sp. (рис. 3). У мацераті зразків цього проміжку відмічені дрібні часточки вулканічного скла.

Відклади датовані альбом за віком фауни (*Стратиграфія...*, 2013; *Іщенко та ін.*, 2016), за власними даними спорово-пилкового аналізу та даними інших дослідників (*Орлова-Турчина*, 1966; *Воронова*, 1994) та за вперше проведеними палеоальгологічними дослідженнями на території Каркінітсько-Північнокримського прогину. Границя ярусів апту та альбу проводиться за появою в альбських відкладах

зональних форм диноцист *Pterodinium aliferum* Eisenack (див. фото 3, рис. 4).

Сеноманський ярус. Відклади сеноманського ярусу широко розповсюджені на всій території Рівнинного Криму. Вони представлені ефузивними пірокластичними породами, пісковиками, кременистими алевролітами, мергелями глинистими. Товщина відкладів близько 300 м (*Стратиграфія...*, 2013).

Диноцисти. У зразках з гл. 2228 м св. № 29 встановлено диноцисти сеноманського віку: *Epelidosphaeridia*

spinosa (Cookson and Hughes) Davey – зональний вид (рис. 4, фото 2), *Isabelidinium* sp. Відмічено багато *Spiniferites ramosus* (Ehrenberg) Mantell., *Achomosphaera ramulifera* (Deflandre) Evitt., *Pterodinium* spp., *Systematophora* sp., *Chlamydophorella nyei* Cookson and Eisenack, постійні – *Odontochitina* sp., поодинокі – *Oligosphaeridium* sp., *Cleistosphaeridium* sp., *Pervosphaeridium pseudohystrichodinium* (Deflandre) Yun Hyesu., *Prolixosphaeridium* sp., *Callaiosphaeridium* sp., *Batiacasphaera* sp., *Sentusidinium* sp.

Рис. 4. Диноцисти барем-альбських відкладів св. № 29:

1. *Trichodinium* sp., зр. 12, альб; 2. *Epelidosphaeridia spinosa* (Cookson and Hughes) Davey, зр. 15, сеноман;
3. *Pterodinium aliferum* Eisenack, зр. 12, альб; 4. *Spiniferites* sp., зр. 7, апт; 5. *Callaiosphaeridium* sp., зр. 13, альб;
6. *Spiniferites ramosus* (Ehrenberg) Mantell, зр. 2, барем; 7. *Chlamydophorella nyei* Cookson and Eisenack, зр. 4, апт;
8. *Prolixosphaeridium* sp., зр. 4, апт; 9. *Achomosphaera* sp., зр. 3, барем;
10. *Oligosphaeridium complex* (White) Davey and Williams, зр. 7, апт; 11. *Circulodinium* sp., зр. 2, барем;
12. *Circulodinium distinctum* (Deflandre and Cookson) Jansonius, зр. 12, альб; 13. *Hystrichodinium solare* Pestchevitskaya, зр. 2, барем

Сеноманський спорово-пилковий комплекс. Участь спор папоротеподібних невелика – до 15 %, пилку голонасінних і покритонасінних – до 75 %. У цьому спорово-пилковому комплексі загальна кількість

екземплярів у мацератах невелика порівняно з іншими комплексами. Рідко зустрічаються спори *Gleicheniidites* sp., *Plicifera delicata* (Bolch.) Bolch., *Cyathidites* sp., *Lygodiumsporites* sp. Часто трапляються бобоподібні

спори родини Polypodiaceae (*Polipodiumsporites* sp.). У комплексі присутній різноманітний пилок голонасінних – до 50 %. Пилок Ginkgocusadaceae зустрічається рідко й не в усіх спектрах. Характерною особливістю комплексу є домінування серед голонасінних пилок хвойних родини Pinaceae. Він представлений головним чином родами *Pinuspollenites* spp. та поодинокими екземплярами пилок *Cedripites* spp. Також присутній пилок родини Podocarpaceae (*Podocarpidites* sp.) в незначних кількостях. Трапляється різноманітний пилок покритонасінних – до 25 %. Переважає пилок *Liliacidites* sp. та пилок, визначений за штучною

класифікацією: *Tricolpopollenites* sp. Домінують пилкові зерна *Clavatipollenites* sp. (рис. 3).

Відклади датовані сеноманом за віком фауни (*Стратиграфія...*, 2013), даними спорово-пилкового аналізу та за вперше проведеними палеоальгологічними дослідженнями на території Каркінітсько-Північнокримського прогину.

У статті (рис. 4–6) подано фотозображення диноцист і супутніх мікрофосилій – спор і пилок вищих рослин, рештки деревини та мікрофорамініфер з баремських, аптських, альбських і сеноманських відкладів.

Рис. 5. Мікрофітопланктон барем-альбських відкладів св. № 29:

1. *Apteodinium* sp., зр. 13, альб; 2. *Isabelidinium* sp., зр. 15, сеноман; 3. *Cribroperidinium* sp., зр. 12, альб;
4. *Apteodinium maculatum* subsp. *grande* (Cookson and Hughes) Below, зр. 13, альб;
5. *Odontochitina operculata* (O. Wetzel) Deflandre and Cookson, антапікальна частина теки, зр. 4, апт;
6. *Odontochitina* sp., апікальна частина теки, зр. 4, апт; 7. *Cribroperidinium* sp., зр. 13, альб;
8. *Achomosphaera ramulifera* (Deflandre) Evitt., зр. 15, сеноман; 9. Рештки зелених водоростей *Tasmanites* sp., зр. 14, альб

Рис. 6. Мікрофосилії барем-альбських відкладів св. № 29.

Спори: 1. *Murosporoides* sp., зр. 4, апт; 2. *Matonisporites* sp., зр. 1, альб; 3. *Pilosisporites* sp., зр. 3, барем;

4. *Appendicisporites* sp., зр. 3, барем; 5. *Cicatricosisporites* sp., зр. 2, барем;

6. *Retitriteles austroclavatidites* (Cookson) Doring et al., зр. 14, альб; 7. *Klukisporites variegatus* Couper, зр. 7, апт;

11. *Gleichenioidites senonicus* Ross., зр. 9, апт; 12. *Ornamentifera* sp., зр. 12, альб.

Пилок: 9. *Pinuspollenites* sp., зр. 13, альб; 10. *Liliacidites* sp., зр. 15, сеноман; 13. *Welwitschiapites* sp., зр. 10, апт. 8.

Рештки деревини, зр. 10, апт. **Акритархи:** 14. *Fromea* sp., зр. 13, альб.

Органічна складова мікрофораменіфер: 15. Устілка мікрофораменіфери, зр. 3, барем; 16. Устілка мікрофораменіфери, зр. 14, альб

Висновки. Уперше вивчено крейдові відклади Каркінітсько-Північнокримського прогину та проведено детальне біостратиграфічне розчленування цих відкладів на рівні регіональних стратонів за диноцистами та спорово-пилковим комплексом. За результатами дослідження можна зробити висновок щодо віку відкладів та умов осадконакопичення. У Каркінітсько-Північнокримському прогині крейдові відклади зі св. 29 представлені прибережно-морськими відкладами верхнього барему, континентальними чи прибережно-морськими відкладами апту, морськими та вулканогенними відкладами альбу та морськими відкладами сеноману. Палінологічно досліджено відклади св. № 29, представлені алевроитовими глинами та пісковиками, охарактеризовані мікрофосиліями, у результаті доповнена палеонтологічна характеристика Стратиграфічних схем регіону Рівнини Крим. За систематичним складом виявлених диноцист і за даними спорово-пилкового аналізу

встановлено вік вмісних відкладів як барем-апт-альб-сеноманський св. № 29 проміжку гл. 3142–2228 м. Розчленовано відклади, що раніше датувались як неокот. Уперше підтверджено присутність відкладів барему та апту на території Каркінітсько-Північнокримського прогину за диноцистами.

Виконано кореляцію з Міжнародною стратиграфічною шкалою для мезозою, побудованою на еволюції морської фауни – ортостратиграфічної групи амонітів та інших, у тому числі – диноцист (Gradstein et al., 2012; 2020).

Автори висловлюють свою подяку професорці А.С. Андреевій-Григорович за корисні поради та консультації.

Стаття висвітлює результати досліджень, які частково профінансовано за бюджетною програмою "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень" (КПКВК 6541230).

Список використаних джерел

- Воронова, М.А. (1994). Палиностратиграфія нижнього мелу і розвитку раннемелових флор України. Київ: Наук. думка.
- Воронова, М.А., Карева, Л.Ф. (1989). Водоросли альба Волино-Подолі. Сб. "Палинологія попутних ископаемых". Минск.
- Воронова, М.А., Яновская, Г.Г. (1981). Остатки микрофитопланктона в юрских и меловых отложениях Украины. *Систематика, эволюция, экология водорослей и их значение в практике геологических исследований*. Киев: Наукова думка, 19–20.
- Вялов, О.С., Андреева-Григоревич, А.С., Гавура, С.П. и др. (1989а). Региональная схема стратиграфии меловых отложений Украинских Карпат. *Палеонтол. сб., Львов*, 26, 71–72.
- Вялов, О.С., Андреева-Григоревич, А.С., Гавура, С.П. и др. (1989б). Объяснительная записка к региональной стратиграфической схеме меловых отложений Украинских Карпат. Львов.
- Геология шельфа СССР. (1984). Том Стратиграфия (шельф и побережье Черного моря). Отв. ред. Ю.В. Тесленко. Киев: Наукова думка.
- Гожик, П.Ф., Маслун, Н.В., Плотнокова, Л.Ф., Іванік, М.М., Якушин, Л.М., Іщенко, І.І. (2006). Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. Київ: Логос.
- Григоревич, А.С. (1979). Микрофитопланктон меловых и палеогеновых отложений северного склона Украинских Карпат. *Бюл. МОИП. Отд. геол.*, 2, 83–98.
- Гричук, В.П., Заклинская, Е.Д. (1948). Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеографии. Москва: ОГИЗ.
- Доротяк, Ю.Б., Матвеев, А.В., Шевчук, Е.А. (2009). Характеристика пограничных отложений юры и мела в Горном Крыму (фораминиферы, известковый нанопланктон, диноцисты, палинокомплексы). *Зб. наук. праць Інституту геологічних наук НАН України. Випуск фауна і флора України: Палеогеологічний та стратиграфічний аспекти*, 108–117.
- Єсипович, С.М. (2002). Розвиток седиментаційних комплексів від середньої юри до нижньої крейди на північно-західному шельфі Чорного моря. *Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ*, 3(4), 42–49.
- Жабіна, Н., Анікеєва, О., Колодій, І., Мінтузова, Л. (2015). Нові дані про стратиграфію відкладів та гідрогеохімічні умови Придніпровської площі (північно-західний шельф Чорного моря). *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія*, 70 (3), 15–22.
- Іщенко, І.І., Лещук, Р.Й., Якушин, Л.М. (2016). Стратиграфія крейдових відкладів Рівнинного Криму. Стаття 1. Нижня крейда. *Геол. журнал*, 2 (355), 73–89.
- Колодій, В.В. (1971). Про походження гідрохімічних аномалій на Октярському нафтовому та Західно-Октярському газоконденсатному родовищах Криму. *Геологія і геохімія горючих копалин*, 27, 16–19.
- Мельничук, П.М. (2003). Особливості геологічної будови нижньокрейдових відкладів і перспективи їхнього освоєння в межах північно-західного шельфу Чорного моря. *Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ*, (8), 87–96.
- Огороднік, М. (2006). Зональна шкала біостратиграфічних підрозділів титону – сеноману Передкарпаття за палинологічними даними та перидінеєвими водоростями. *Палеонт. зб., Львів*, 38, 65–72.
- Огороднік, М. (2007). Стратиграфічне розчленування нижньої крейди розшукової свердловини Західнобірюча-1 шельфу Азовського моря за палинологічними даними. *Палеонт. зб., Львів*, 39, 27–36.
- Орлова-Турчина, Г.А. (1966). Спорно-пыльцевые комплексы готерива и баррема западной и центральной частей Равнинного Крыма. *Палеонтол. сб.*, 3, 1, 90–96.
- Сидоренко, А.В. (1969). Геология СССР. Крым. Геологическое описание. Т. VIII. Ч. I. Изд-во "Недра".
- Стратиграфічний кодекс України. (2012). Відп. ред. П.Ф. Гожик. 2-е вид. Київ.
- Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. (2013): Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України. Гол. ред. П.Ф. Гожик. ІГН НАН України. Київ: Логос.
- Шевчук, Е.А. (2006). Динофитові водорослі із мелових відкладів північно-західної України (Волинь). *Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Проблеми біостратиграфії нижнього протерозою і фанерозою України*, 118–123.
- Шевчук, О.А. (2005). Знахідки цист динофлагелат в крейдових відкладах Волино-Поділля. *Палеонт. зб., Львів*, 37, 84–88.
- Шевчук, О.А. (2011). Палиностратиграфія та кореляція різнофазціальних альбських відкладів України. *Палеонт. зб., Львів*, 43, 3–13.
- Шевчук, О.А. (2013). Палиностратиграфія крейдових відкладів української частини акваторії Азовського моря. *Тектоніка і стратиграфія*, 40, 118–124.
- Шевчук, О.А. (2018). Spore-pollen biostratigraphy Jurassic and Cretaceous of Ukraine. *Палеонт. зб., Львів*, 50, 60–72.
- Fensome, R.A., Taylor, F.J.R., Norris, G., Sarjeant, W.A.S., Wharton, D.I. and Williams, G.L. (1993). A classification of fossil and living dinoflagellates. *Micropaleontology. Spec. Publ.*, 7, 351.
- Gradstein, F.M., Ogg, J., Schnitz, M.D., Ogg, G.M. (2020). The Geological Time Scale. Vol. 1, Vol. 2. Elsevier BV.
- Gradstein, F.M., Ogg, J., Schnitz, M.D., Ogg, G.M. (2012). The Geological Time Scale. Vol. 2. Elsevier BV.
- Rehakova, D., Matyja, B., Wierzbowski, A., Schlogl, J., Krobicki, M., Barski, M. (2011). Stratigraphy and microfacies of the Jurassic and lowermost Cretaceous of the Veliky Kamenets section (Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Western Ukraine). *Volumina Jurassica*, 9, 9, 61–104.
- Shevchuk, O.A. (2005). Finds of dinoflagellate cysts in Cretaceous sediments of Volyn-Podillya. *Paleontol. collection, Lviv*, 37, 84–88. [in Ukrainian]
- Shevchuk, O.A. (2011). Palynostratigraphy and correlation of different facies Albian deposits of Ukraine. *Paleontol. collection, Lviv*, 43, 3–13. [in Ukrainian]
- Shevchuk, O.A. (2013). Palynostratigraphy of Cretaceous deposits of the Ukrainian part of the Azov Sea. *Tectonics and stratigraphy*, 40, 118–124. [in Ukrainian]
- Shevchuk, O.A. (2018). Spore-pollen biostratigraphy Jurassic and Cretaceous of Ukraine. *Paleontol. collection, Lviv*, 50, 60–72.
- Shevchuk, O., Vajda, V. (2014). Taxonomic diversity of dinoflagellates in the Cretaceous seas traced in the Crimean Mountains. *Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Біорізномор'я і устійливе розвиток". Сімферополь*, 391–392.
- Shevchuk, O.A., Vajda, V. (2016). Stratigraphy and paleoecology of Middle Jurassic dinocyst assemblages from the Dnieper-Donets Basin of central Ukraine. Paper 5193, Symposium, T. 44. P. 1. *Palaeontology and Palaeo-anthropology, 35th International Geological Congress, Cape Town, South Africa*, 1, 55–57.
- Shevchuk, O.A. (2020). Dinocysts in Callovian Deposits of Central Ukraine. *International Journal on Algae*, 22(3), 279–286.
- Williams, G.L., Fensome, R.A., MacRae, R.A. (2017). The Lentin and Williams index of fossil dinoflagellates 2017 edition. *AASP Contributions Series Number 48*. American association of stratigraphic palynologists foundation.

References

- Dorotyak, Yu.B., Matveev, A.V., Shevchuk, E.A. (2009). Characteristics of the Jurassic and Cretaceous boundary deposits in the Crimean Mountains (foraminifera, calcareous nannoplankton, dinocysts, palynological complexes). *Collection of Scientific Works for the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine. Fossil fauna and flora of Ukraine: Paleoeological and stratigraphic aspects*, Kyiv, 108–117. [in Russian]
- Fensome, R.A., Taylor, F.J.R., Norris, G., Sarjeant, W.A.S., Wharton, D.I. and Williams, G.L. (1993). A classification of fossil and living dinoflagellates. *Micropaleontology. Spec. Publ.*, 7, 351.
- Geology of the shelf of the Ukrainian SSR. (1984). Volume Stratigraphy (Shelf and Black Sea Coast). Resp. eds. Yu.V. Teslenko. Kyiv: Naukova Dumka. [in Russian]
- Gozhik, P.F., Maslun, N.V., Plotnikova, L.F., Ivanik, M.M., Yakushin, L.M., Ishchenko, I.I. (2006). Stratigraphy of the Mezo-Cenozoic deposits of the northwest shelf of the Black Sea. Kyiv: Logos. [in Ukrainian]
- Gradstein, F.M., Ogg, J., Schnitz, M.D., Ogg, G.M. (2012). The Geological Time Scale. Vol. 2. Elsevier BV.
- Gradstein, F.M., Ogg, J., Schnitz, M.D., Ogg, G.M. (2020). The Geological Time Scale. Vol. 1. Vol. 2. Elsevier BV.
- Grichuk, V.P., Zaklinskaya, E.D. (1948). Analysis of fossil pollen and spores and its application in paleogeography. Moscow: OGIZ. [in Russian]
- Grigorovich, A.S. (1979). Microphytoplankton of Cretaceous and Paleogene deposits of the northern slope of the Ukrainian Carpathians. *Bul. MOIP. Dept. geol.*, 2, 83–98. [in Russian]
- Ishchenko, I.I., Leschukh, R.I., Yakushin, L.M. (2016). Stratigraphy of Cretaceous sediments in the Plain Crimea. Paper 1. Lower Cretaceous. *Geological magazine*, 2 (355), 73–89.
- Kolodiy, V.V. (1971). On the origin of hydrochemical anomalies at the Otkyabsky oil and West-Otkyabsky gas condensate fields of Crimea. *Geology and geochemistry of combustible minerals*, 27, 16–19. [in Ukrainian]
- Melnychuk, P.M. (2003). Features of the geological structure of the Lower Cretaceous deposits and prospects for their development within the north-western shelf of the Black Sea. *Exploration and development of oil and gas fields*, (8), 87–96. [in Ukrainian]
- Ogorodnik, M. (2006). Zonal scale of biostratigraphic subdivisions of Tithonian–Cenomanian of Precarpathia according to palynological data and Peridinea algae. *Paleontol. collection, Lviv*, 38, 65–72. [in Ukrainian]
- Ogorodnik, M. (2007). Stratigraphic division of the lower Cretaceous of the West Biryuchacha – 1 exploration well of the Azov Sea shelf according to palynological data. *Paleontol. collection, Lviv*, 39, 27–36. [in Ukrainian]
- Orlova-Turchina, G.A. (1966). Spore-pollen complexes of Hauterivian and Barremian of the western and central parts of the Plain Crimea. *Paleontol. collection*, 3, 1, 90–96. [in Russian]
- Rehakova, D., Matyja, B., Wierzbowski, A., Schlogl, J., Krobicki, M., Barski, M. (2011). Stratigraphy and microfacies of the Jurassic and lowermost Cretaceous of the Veliky Kamenets section (Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Western Ukraine). *Volumina Jurassica*, 9, 9, 61–104.
- Shevchuk, E.A. (2006). Dinophytic algae from Cretaceous sediments of northwestern Ukraine (Volyn). *Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine. Problems of biostratigraphy of the lower Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine*, Kyiv, 118–123. [in Russian]
- Shevchuk, O., Vajda, V. (2014). Taxonomic diversity of dinoflagellates in the Cretaceous seas traced in the Crimean Mountains. *Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Biodiversity and Sustainable Development". Simferopol*, 391–392.
- Shevchuk, O.A. (2005). Finds of dinoflagellate cysts in Cretaceous sediments of Volyn-Podillya. *Paleontol. collection, Lviv*, 37, 84–88. [in Ukrainian]
- Shevchuk, O.A. (2011). Palynostratigraphy and correlation of different facies Albian deposits of Ukraine. *Paleontol. collection, Lviv*, 43, 3–13. [in Ukrainian]
- Shevchuk, O.A. (2013). Palynostratigraphy of Cretaceous deposits of the Ukrainian part of the Azov Sea. *Tectonics and stratigraphy*, 40, 118–124. [in Ukrainian]
- Shevchuk, O.A. (2018). Spore-pollen biostratigraphy Jurassic and Cretaceous of Ukraine. *Paleontol. collection, Lviv*, 50, 60–72.

Shevchuk, O.A., Vajda, V. (2016). Stratigraphy and paleoecology of Middle Jurassic dinocyst assemblages from the Dnieper-Donets Basin of central Ukraine. Paper 5193, Symposium, T44.P1. *Palaeontology and Palaeo-anthropology, 35th International Geological Congress, Cape Town, South Africa*, 1, 55–57.

Shevchuk, O.A. (2020). Dinocysts in Callovian Deposits of Central Ukraine. *International Journal on Algae*, 22(3), 279–286.

Sidorenko, A.V. (1969). Geology of the USSR. Crimea. Geological description. Publishing house "Nedra". Vol. VIII, Part I. [in Russian]

Stratigraphic Code of Ukraine. (2012). Resp. Eds. P.F. Gozhik. 2nd edition. Kyiv. [in Ukrainian]

Stratigraphy of the Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine. (2013). In *Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine*. Ch. Eds. P.F. Gozhik. IGN NAS of Ukraine. Kyiv: Logos. [in Ukrainian]

Voronova, M.A. (1994). Palinostratigraphy of the Lower Cretaceous and the development of early Cretaceous flora of Ukraine. Kyiv: Scientific thought. [in Russian]

Voronova, M.A., Kareva, L.F. (1989). Albian algae of Volyn-Podolia. *Sat. "Palynology of minerals"*. Minsk. [in Russian]

Voronova, M.A., Yanovskaya, G.G. (1981). Residues of microphytoplankton in Jurassic and Cretaceous sediments of Ukraine.

Systematics, evolution, ecology of algae and their significance in the practice of geological research. Science opinion. Kyiv, 19–20. [in Russian]

Vyalov, O.S., Andreeva-Grigorovich, A.S., Gavura, S.P. et al. (1989a). Regional scheme of the stratigraphy of the Cretaceous deposits of the Ukrainian Carpathians. *Paleontol. collection, Lviv*, 26, 71–72, 61. [in Russian]

Vyalov, O.S., Andreeva-Grigorovich, A.S., Gavura, S.P. et al. (1989b). Explanatory note to the regional stratigraphic scheme of the Cretaceous deposits of the Ukrainian Carpathians. *Lviv*. [in Russian]

Williams, G.L., Fensome, R.A., and MacRae, R.A. (2017). The Lentin and Williams index of fossil dinoflagellates 2017 edition. *AASP Contributions Series Number 48*. American association of stratigraphic palynologists foundation.

Yesipovich, S.M. (2002). Development of sedimentation complexes from the Middle Jurassic to the Lower Cretaceous on the northwestern shelf of the Black Sea. *Exploration and development of oil and gas fields*, 3 (4), 42–49. [in Ukrainian]

Zhabina, N., Anikeeva, O., Kolodiy, I., Mintuzova, L. (2015). New data on sediment stratigraphy and hydrogeochemical conditions of Pradniprovska Square (northwestern shelf of the Black Sea). *Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology*, 70 (3), 15–22. [in Ukrainian]

Надійшла до редколегії 21.04.21

O. Shevchuk, PhD (Geol.), leading Researcher,

E-mail: hshevchuk@ukr.net,

Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, 55, b, O. Honchara Str., Kyiv, 01601, Ukraine;

D. Pustovoiitova, Student,

E-mail: jamm3782@gmail.com,

Taras Shevchenko National University of Kyiv,

Institute of Geology, 90 Vasylykivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine

STRATIFICATION OF CRETACEOUS DEPOSITS OF THE SECTION № 29 – ZAKHIDNOOKTYABRSKA (KARKINITSKO-NORTH CRIMEAN TROUGH) BY PALYNOLOGICAL DATA

The Karkinitsko-North Crimean trough is a promising region of Ukraine for the search for hydrocarbons, and one of the main oil and gas complexes is the Cretaceous. Therefore, a detailed biostratigraphic subdivision of the Cretaceous sediments is important and necessary, which are the basis for further prospecting work and for the correlation of North Crimean trough with the similar age deposits of the adjacent regions. The Neocomian strata are especially problematic for subdivision and correlation. According to the results of the study of microphytofossils, the stratification of Cretaceous deposits of the Karkinitsko-North Crimean trough was carried out on the example of the supporting well № 29 – Zakhidnooktyabrsk. There are four spore-pollen complexes: Barremian, Aptian, Albian and Cenomanian. For the first time, the Cretaceous deposits were dissected according to the systematic composition of dinocysts, as well as the paleontological characteristics of sediments by other groups of microfossils – spores and pollen of higher plants, remnants of green algae, acritarchs and microforaminifers.

Keywords: biostratigraphy, dinocysts, spore-pollen complexes, Cretaceous deposits, Karkinitsko-North Crimean trough.

Е. Шевчук, канд. геол. наук, вед. науч. сотр.,

E-mail: hshevchuk@ukr.net,

Институт геологических наук НАН Украины,

ул. О. Гончара, 55, б, г. Киев, 01601, Украина;

Д. Пустовойтова, студ.,

E-mail: jamm3782@gmail.com,

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, УНИ "Институт геологии",

ул. Васильковская, 90, г. Киев, 03022, Украина

СТРАТИФИКАЦИЯ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЗРЕЗА СКВАЖИНЫ № 29 – ЗАПАДНООКТЯБРЬСКОЙ (КАРКИНИТСКО-СЕВЕРОКРЫМСКИЙ ПРОГИБ) ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Каркинитско-Северокрымский прогиб – перспективный регион Украины для поиска углеводородов, где один из главных нефтегазоносных комплексов – меловой. Поэтому важным и необходимым является детальное биостратиграфическое расчленение меловых отложений, которые служат основой для дальнейших поисковых работ и для корреляции исследованных меловых отложений Каркинитско-Северокрымского прогиба с разновозрастными отложениями смежных регионов. Особенно проблемной для расчленения и корреляции является плохо исследованная неокомская толща. По результатам изучения микрофитофоссилий проведено стратификацию меловых отложений Каркинитско-Северокрымского прогиба на примере опорной скважины № 29 – Западнооктябрьской. Выделены четыре спорово-пыльцевых комплекса: баремский, аптский, альбский и сеноманский. На исследуемой территории впервые проведено расчленение меловых пород по систематическому составу диноцист, а также дополнена палеонтологическая характеристика отложений по другим группам микрофоссилий – споры и пыльца высших растений, остатки зеленых водорослей, акритархи и микрофораминиферы.

Ключевые слова: биостратиграфия, диноцисты, спорово-пыльцевые комплексы, меловые отложения, Каркинитско-Северокрымский прогиб.